

ANALES

DE

OFTALMOLOGIA

TRABAJOS ORIGINALES

Tratamiento de las neuritis ópticas¹

POR EL DR. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ (León, Guanajuato, México)

Infinidad de atrofas del nervio óptico son consecutivas á neuritis; y entre las causas de ceguera definitiva, cuéntanse las atrofas del segundo par, como de las que más contribuyen á engrosar las filas de los desterrados de la luz: en una pequeña estadística mía, que comprende solamente 136 casos de ceguera bilateral y definitiva, entran las atrofas del nervio óptico con 28 casos, ó sea con el 20.58%. Notablemente concorde con la mía, es la estadística del DR. TROUSSEAU, que abarca 627 casos de ceguera, observados en la clínica de Quinze-Vingts, en la cual se señalan 129 casos de atrofia papilar, es decir, el 20.56% del total de cegueras. En el cuadro resumido de MAGNUS (según FUCHS), en 2,528 casos de ceguera bilateral, la atrofia óptica causa el 7.75% de cegueras primitivas y 9.29% de cegueras consecutivas; sea, en total, el 17.04% de todos los casos de ceguera.

¹ Informe presentado á la IV Reunión de la Sociedad Oftalmológica Mexicana. Septiembre de 1910.