


del Radio ejercen una fuerte excitación ya sobre la epidermis como sobre el sistema nervioso.

Las soluciones de estas diversas cuestiones son de alto interés humanitario y están atrayendo la atención de un gran número de fisiólogos y de médicos, que persiguen en estos estudios su ancho campo para lograr un beneficio, por la ciencia, para la humanidad.

México, Julio 15 de 1905.



Supervivencia del Bacilo diftérico

Sabido es que el bacilo diftérico puede persistir de 23 á 78 días después de curada la angina, pues se refiere un caso de difteria de mediana gravedad, que ha sido curado con bastante rapidez aunque persistiendo el bacilo diftérico en la boca por espacio de un año. Durante este período hubo dos recidivas de angina con recrudesencia en el número de los bacilos. No obstante la presencia del bacilo, la salud era perfecta.

Esta persistencia es más común de lo que quiere creerse. Explica las difterias familiares observadas por el Profesor L. Revillo, y sobre todo, la fácil diseminación de la difteria en las escuelas públicas. Los enfermitos, una vez curada su angina, conservan los bacilos de Loeffler en la garganta, y constituyen, por lo tanto, un peligro durante cierto tiempo para las personas que los rodean.

Estos bacilos, que no revelan su presencia por ningún signo clínico, están dotados de extraordinaria virulencia, pues sus cultivos puros en caldo podrían matar á las cavias en 24 ó 48 horas, seis meses después de haber desaparecido todo indicio de angina.